

Trajet de Soins Rachitisme Génétique

HUDERF_HUB



HÔPITAL UNIVERSITAIRE
DE BRUXELLES
ACADEMISCH ZIEKENHUIS
BRUSSEL



		Pendant la consultation				Suivi/ Prescription	Patient Expertise		Other Risks	
		suivi	anamnèse	examen	Prise de sang	autres	traitement	Éducation thérapeutique	Soutien psychologique	complications
0-5 ans		Tous les 1-3 mois	Acceptation et compréhension de l'affection, déformation osseuse, fatigue, acquisition de la marche	Poids, taille, périmètre crânien et forme du crâne, distance intermalleolaire (DIM) ou intercondilien (DIC), signes de rachitisme floride, TA, recherche abcès dentaire		Echographie rénale 1x/an Radiographie membres inférieurs si pas d'amélioration Examen orthopédiste 1x/an Visite chez le dentiste 2x/an	Traitement conventionnel: -Supplément phosphore +/-50 mg/kg/j en 4-6 prises et et alpha 1-2 mcg par jour à adapter en fonction de la biologie et urine -Burosumab après au mois 12 mois de traitement conventionel. Dose de start 0.2 mg/kg/2 semaines et augmenter par palier de 0.2 mg/kg But du traitement guérir ou prévenir le rachitisme Administration aussi de la vitamine D (Dcure)	Information sur le rachitisme le suivi multidisciplinaire, importance d'une bonne compliance. Infos sur association des patient XLH existante. Conseil génétique	Proposer un soutien psychologique aux parents.	Ecolage injection burosumab
5 ans- puberté (9-12 ans)		3-6 mois	Régularité du traitement, acceptation, douleur, raideur, nb d'abcès dentaire, fatigue	Poids, taille, stade pubertaire, présence d'abcès dentaire, signes de rachitisme, DIM, DIC, ex clinique complet, stade pubertaire	Génétique A chaque visite: -Biologie: Ca, P, PAL, PTH, créatinine, albumine -Urine: Calcium et créatinine Une fois par an: Calcium sur urine de 24 h, Natriurie de 24h, Phosphaturie de 24h, 25 OH Vitamine D, 1,25 OH vitamine D (pour patient sous burosumab)	Echographie rénale Examen stomatologique Audiogramme Visite orthopédiste	Ajustement des doses du traitement en fonction de la biologie: - Traitement conventionnel: PAL élevé augmenter les doses de et alpha +/- phosphore. PTH élevé: diminuer le phosphore ou augmenter le et alpha, calciurie élevée diminuer Et alpha +/- phosphore - Traitement par burosumab: augmenter burosumab si phosphate sérique bas et/ou PAL élevé - Hydrochlorotiazide si calciurie élevée, mais PAL non normalisé pour 6-12 mois	Rappel de l'importance du traitement. Importance de la vitamine D (D cure) également. Rappel sur les modes de transmission	Évaluer le besoin de soutien psychologique ou social.	Problèmes de compliance au moment de l'autonomisation. Problème de compliance du traitement conventionnel (gout du phosphore)
Puberté		3 mois				Echographie rénale Examen stomatologique Audiogramme Visite orthopédiste Cardiologue si HTA				
adultes		6-12 mois (6 mois autour de la transition)	Régularité traitement, acceptation, douleur, raideur, nb d'abcès dentaire, audition, fatigue Qualité de vie, emploi, statut social, fertilité, vie de famille, historique de fractures	Poids, taille, BMI, TA, examen clinique, taille assise (tassements vertebrales)		Echographie rénale Examen stomatologique Audiogramme Visite orthopédiste, rhumatologue, nephrologue si besoin	Ajustement des dosages en fonction de la biologie et la calciurie Assurer apports en vitamine 25ohD et hydratation Continuer analogues de vitamine d active Continuer phosphore en âge adulte jusqu'à 25 ans, évaluer besoin selon symptômes par après Rappels dietetiques (apports en calium, sodium, hydratation) Cinacalcet si hyperparathyroïdie tertiaire voire parathyroïdectomie si hyperparathyroïdie tertiaire voire parathyroïdectomie si hyperparathyroïdie tertiaire voire parathyroïdectomie à discuter en équipe multidisciplinaire	Rappel manifestation de la maladie, possibilité de transmission, conseil genetique et planification d'une grossesse	Évaluer le besoin de soutien psychologique ou social. Informations sur associations patients	Problèmes de compliance. Intensification du suivi pendant une grossesse
Late adulthood						Rx bassins, colonne, MI selon besoins (pseudofractures, tassements) Scintigraphie osseuse pour enthesopathies selon besoins DEXA scan, VFA baseline et puis selon recommandations population générale	Si pseudofractures : indication de burosumab à l'age adulte selon guidelines			Risque de nephrolithiase, enthesopathies, pseudofractures, troubles neurologiques