

Deze informatiebrochure geeft algemene informatie. In bijzondere gevallen kan een andere benadering of behandeling aangewezen zijn. U kunt met al uw vragen terecht bij uw arts of bij een kinderchirurg.

Beste ouders

Met dit document willen we u uitleggen wat circumcisie (besnijdenis) is, hoe we dit behandelen en wat de mogelijke verwikkelingen zijn.

H.U.B

HÔPITAL UNIVERSITAIRE
DE BRUXELLES
ACADEMISCH ZIEKENHUIS
BRUSSEL



Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Jean-Joseph Crocq laan 15 - 1020 Brussel

T +32 (0)2 477 33 11

M communication@hubruxelles.be

www.huderf.be

Afdeling kinderchirurgie

Verantwoordelijke uitgever: Communicatiedienst H.U.B
Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
Jean-Joseph Crocq laan 15 - 1020 Brussel
06/2023

H.U.B

HÔPITAL UNIVERSITAIRE
DE BRUXELLES
ACADEMISCH ZIEKENHUIS
BRUSSEL



De circumcisie (besnijdenis)

Afdeling kinderchirurgie

Wat is circumcisie?

De meest gebruikelijke vorm van circumcisie (besnijdenis) is het verwijderen van de voorhuid, waardoor de eikel van de penis permanent ontbloot is.

Rituele besnijdenis wordt al sinds de Oudheid om culturele en religieuze redenen toegepast. Sommige bevolkingsgroepen passen besnijdenis toe zonder religieuze motieven maar om redenen van hygiëne en problemen met het terugschuiven van de voorhuid.

De circumcisie kan ook om medische redenen worden uitgevoerd. Soms zit de voorhuid te strak zodat men de eikel niet volledig kan ontbloten. Dit wordt een fimosis of voorhuidvernauwing genoemd. Dit kan hinderlijk of zelfs pijnlijk zijn; het kan ook infecties (balanitis) veroorzaken. Dit wordt dan een besnijdenis genoemd.

In ons ziekenhuis wordt de circumcisie uitgevoerd na de leeftijd van één jaar, tenzij een vroegere ingreep wenselijk is om medische redenen.

Het praktisch verloop?

De circumcisie wordt uitgevoerd onder algemene verdoving, gekoppeld aan een lokale verdoving van de penis. Meestal wordt de ingreep uitgevoerd in het dagziekenhuis (poliklinisch), zodat het kind dezelfde dag nog uit het ziekenhuis ontslagen wordt en weer naar huis mag.

Als het kind nog een andere aandoening heeft (hart, longen, ...), kan de anesthesist beslissen om het kind voor meerdere nachten in het ziekenhuis op te nemen.

Er worden hechtingen aangebracht die na 2 tot 3 weken spontaan uitvallen.

Bij het verlaten van het ziekenhuis worden pijnstillers voorgeschreven voor de eerste 48 uren na de ingreep. U ontvangt een document dat de aangeraden post-operatieve lokale verzorging verduidelijkt, meer bepaald het aanbrengen van een vette zalf (Terracortril®), gedurende 2 tot 3 dagen.

Er wordt een afspraak gemaakt voor een chirurgieconsultatie, ongeveer een week na de ingreep.

Na de ingreep weer naar huis

Uw kind krijgt pijnstillers om de pijn van de wondheling voor te zijn. De pijnbehandeling helpt het kind om zo spoedig mogelijk zijn normale activiteiten te hervatten.

Het verband valt na enkele verschoningen vanzelf weg. Als het verbandje niet binnen de 24 uur na de operatie eraf valt, doorweekt u het met warm water. Een douche nemen kan ook helpen. Verwijder het voorzichtig en breng dan 2 tot 3 dagen lang een vette stof aan, na elke verschoning of na elke plasbeurt. De vette zalf verhindert het verklevan van de wonde met de luier.

Baden wordt afgeraden tijdens de 2 dagen die op de ingreep volgen: een douche is wel toegestaan.

De iets grotere jongens dragen voor het comfort een wijde, soepele broek (joggingpak, pyjama).

De hechtingen vallen spontaan uit na 2 tot 3 weken.

Gedurende de eerste maand na de ingreep raden we aan om niet te zwemmen of te baden in zee, zwemmen in het zwembad of paardrijen.

Wat zijn de mogelijke complicaties?

Af en toe is er sprake van een matige bloeding ter hoogte van de hechtingen, een zwelling van de penis, lichts koorts of een bloeduitstorting ter hoogte van de penisbasis, te wijten aan de plaatselijke verdoving.

Soms kan er wat etter verschijnen. Verzorg dit met isobetadine ontsmetting.

Soms verschijnen er ook geelachtige korstjes. Deze mogen niet verwijderd worden maar enkel verzacht met een vette stof (vaseline, olijfolie, ...). Deze korstjes kunnen de urinebuis gedeeltelijk blokkeren zodat uw zoontje 'in alle richtingen plast'. Dit komt na enkele dagen terug in orde.

