

Accéder à l'Hôpital des Enfants

Adresse : avenue J. J. Crocq 15, 1020 Bruxelles



Parking patient accessible.
Paiement uniquement par carte bancaire.

La borne de paiement se situe sur le chemin menant de l'entrée principale au parking patient.
Aux alentours de l'hôpital, attention : stationnement payant avec horodateur ou zone bleue avec disque de stationnement obligatoire.



Emplacements vélos et deux roues disponibles sur le site Horta.



Lignes transports en commun :
Houba Brugmann, Crocq, Stiénon, Kufferath, Hôpital des Enfants



Gare de Jette



Les équipes d'hygiène hospitalières regroupent en leur sein les médecins et infirmiers hygiénistes, ainsi que d'autres professionnels administratifs et scientifiques compétents dans le domaine de l'hygiène. Ce sont les structures opérationnelles chargées de la prévention des infections liées aux activités de soins dans les hôpitaux qui forment l'H.U.B. Leurs rôles sont de mettre en place la stratégie de prévention au sein du HUB, de déployer les outils de maîtrise de risques et de conseiller pour éviter la survenue de ces infections.



HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE BRUXELLES
ACADEMISCH ZIEKENHUIS BRUSSEL



Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
Avenue Jean-Joseph Crocq 15 - 1020 Bruxelles
T +32 (0)2 477 33 11 - M info@huderf.be
www.huderf.be

Editeur responsable : Service de communication H.U.B.
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
Avenue Jean-Joseph Crocq 15 - 1020 Bruxelles
07/2023

H.U.B.

HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE BRUXELLES
ACADEMISCH ZIEKENHUIS BRUSSEL



Procédure de décontamination destinée aux patients pédiatriques porteurs de MRSA* (et leur parents) pour lesquels une décontamination a été indiquée

* *Staphylocoque doré résistant à la méticilline*



Schéma de décontamination

Où	Quoi*	Quand
Corps	Hibiscrub® (chlorhexidine 4%) ou Iso-bétadine® savon	1X/j pendant 5 jours
Cheveux	(polyvidone iode 7,5 %) ou Stellisept®med lotion lavante	1X/j le 1 ^{er} et le 5 ^{ème} jour
Nez	Bactroban® (mupirocine) crème nasale ou Isobétadine® gel	3X/j pendant 5 jours
Bouche	Corsodyl® (chlorhexidine 0,02%) ou Iso-bétadine® buccale	3X/j pendant 5 jours

* Utilisez uniquement le médicament qui vous a été prescrit par votre médecin



La décontamination concerne le patient pédiatrique et les proches qui cohabitent avec celui-ci.

Comment faire ?


TOILETTE CORPS ET CHEVEUX

A la douche

1. Retirer les bijoux + Hygiène des mains
2. Humidifier la peau et les cheveux
3. Savonner avec les mains
4. Laver tout du haut vers le bas
5. Insister sur les aisselles (zone 1) et le nombril (zone 2)
6. Réaliser la toilette intime et insister sur la zone inguinale (3)
7. Rincer à l'eau
8. Sécher avec une serviette propre

Si toilette au lit :

Utiliser deux gants de toilette propres : un pour le corps et un pour la toilette intime



Pendant la période de décontamination : changement du linge (literie, vêtements, linge de toilette) si possible quotidiennement ou au minimum au J1 et J5 de décontamination

Comment faire ?

SOIN DE NEZ



Déposer la pommade sur les 2 extrémités d'un coton tige et badigeonner l'intérieur de chacune des fosses nasales antérieures.

SOIN DE BOUCHE

A distance du repas



Faire un bain buccal avec le désinfectant et gargariser.

Ne pas l'avaler !!!

OU

chez les plus petits, imbiber un écouvillon avec le désinfectant et badigeonner l'intérieur de la bouche.